

Műtéti tájékoztató és áránlat

THÉTA Egészségközpont

1097 Budapest, Vaskapu u. 17.

7625 Pécs, Tettye u. 40.

Kapcsolattartó:

Sárosi Judit

Telefon: +36 20 402 4224

E-mail: thetakozyont@gmail.com



Aranyérkezelés Lézeres - mikrohullámú készülékkel

A betegség leírása

Az aranyér egy megduzzadt vércöteg, ami a végbél alsó részén vagy a végbélnyílásnál található. Fő tünetei a vérzés, fájdalom, kitüremkedés, viszketés. Kialakulásának hajlamosító tényezői: öröklődés, terhesség, szülés, elhízás, mozgásszegény életmód, ülő munka, nehéz helytelen táplálkozás.

Megjelenési formái: Az aranyerességnek **négy fokozatát** különböztetjük meg súlyosságuktól függően. **I.** (még nem dudorodik ki), **II.** (székelés közben dudorodik ki, de később visszahúzódik), **III.** (székelés közben dudorodik ki, de manuálisan visszahúzható), **IV.** (mindig kitüremkedik, nem tolható vissza) **stádium**. A korai I-es stádiumban konzervatív eszközök, étrendi változtatások, gyógyszer, lokális szerek alkalmazása panaszmentességet hozhat.

Mikor lehet szükség beavatkozásra?

Előrehaladottabb állapotban III.-IV. stádiumban és a legsúlyosabb esetekben már csak műtéti megoldás hagyományos, vagy rádiófrekvenciás kezelés nyújthat segítséget.

A műtét feltételei

- A páciens teljes szellemi és fizikai jólléte,
- **2 hétnél nem régebbi negatív laboratóriumi lelet,**
- **EKG**
- **Budapesti műtétek esetén egy éven belül tüdőszűrő vagy mellkasröntgen eredmény**
- **A szervezési díj befizetése**

A beavatkozáshoz elengedhetetlen, hogy meggyőződjünk arról, hogy a páciensnek **semmilyen gyógyszer allergiája nincs- különös tekintettel a helyi érzéstelenítőkre**. Fontos hogy tájékoztasson minket, ha valamilyen véralvadási zavarban szenved, de a beavatkozás miatt nem kell elhagynia a gyógyszereit- még az alvadás gátlókat sem.

Nem végezhető el a műtét,

Ha a műtét előtti kivizsgálás olyan kóros laboratóriumi értékeket mutat, amelyek kivizsgálását a beavatkozás hátráltathatná. Ezek kivizsgálása után már nem ellenjavallt a műtét elvégzése.

A műtét előkészületei

A műtétet megelőző nap könnyű ebéd után már csak folyadékot (levest,gyümölcslevet,teát, stb.) lehet fogyasztani és dohányozni csak éjfélig megengedett.

ÉJFÉLTŐL ENNI, INNI, DOHÁNYOZNI, MÉG RÁGÓGUMIZNI IS TILOS!

Ha ettől eltér, a műtét nem végezhető el! Rendszeresen szedett gyógyszerei szedéséről a műtétet megelőző időszakban az operáló orvossal történő egyeztetés során kap információt.

Amennyiben szükséges, gondoskodni kell a műtéti terület(ek) szőrtelenítéséről.

A tájékoztató végén található lista figyelembe vétele

A páciens a szóbeli felvilágosítást követően a műtéti megbízást és beleegyező nyilatkozatot aláírja.



EMINEO MAGÁNKÓRHÁZ

1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

2022 Árajánlat

Operáló orvos: Dr. Rozsos István

Tel.: +36 20 941 8603

Beavatkozás: EVLT / EMWA

A műtéti ár tartalmazza:

- Lézeres - mikrohullámú aranyér műtét
- Altatás
- Megfigyelés 4 óra
- A műtét utáni első kontrollt a megbeszélte időpontban

Az Emineo magánkórházban történő műtétek előtt az időpont biztosítása véget **100.000,- Ft szervezési díjat kérünk, melyet a műtét árába beszámítunk.**

Amennyiben a műtét a páciens hibájából hiúsul meg, a szervezési díj vissza nem téríthető.

Fizetési mód: A fennmaradó összeg fizetése 2 módon történhet:

1. a beavatkozás napján reggel, a helyszínen készpénzben
2. a beavatkozás napján reggel, a helyszínen bankkártyával

Amennyiben az euro eléri a 390,-Ft-os árfolyamot, onnantól a díjakat a napi aktuális középárfolyamon számoljuk!



KELEN KÓRHÁZ

1119 Budapest, Than Károly u. 20.

Théta Egészségközpont
1097 Budapest, Vaskapu u. 17.
thetakozyont@gmail.com
www.thetapest.hu
www.oboler.hu

2022 Árajánlat

Operáló orvos: Dr. Rozsos István

Tel.: +36 20 941 8603

Beavatkozás: EVLT/EMWA

A műtéti ár tartalmazza:

- Lézeres-mikrohullámú aranyér műtét
- Altatás
- Megfigyelés 4 óra
- A műtét utáni első kontrollt a megbeszélt időpontban

A Kelen kórházban történő műtétek előtt az időpont biztosítása véget **100.000,- Ft szervezési díjat kérünk, melyet a műtét árába beszámítunk.**

Amennyiben a műtét a páciens hibájából hiúsul meg, a szervezési díj vissza nem téríthető.

Fizetési mód: A fennmaradó összeg fizetése 2 módon történhet:

1. a beavatkozás napján reggel, a helyszínen készpénzben
2. a beavatkozás napján reggel, a helyszínen bankkártyával

Amennyiben az euro eléri a 390,-Ft-os árfolyamot, onnantól a díjakat a napi aktuális középárfolyamon számoljuk!




A műtéti kezelés menete

Az lézer- microhullámú kezelés az Egészségcentrum kezelő helyiségben történik. A műtétet Dr. Rozsos István érsebész végzi.

A beavatkozásnál egy aneszteziológus szakorvos (altatóorvos), valamint egy asszisztens is jelen lesz, aki az orvost segíti az előkészületekben, valamint ellátja az asszisztensi feladatokat is. A beavatkozás **helyi érzéstelenítéssel** elvégezhető, de **bódításban javasoljuk**

A műtét során az aranyerek kijelölése után lándzsával a nodusokat coagulálják ezután gézt helyeznek fel. Számítson arra, hogy az előkészületekkel és utómunkálatokkal együtt legalább 15-30 percet tölt a kezelőhelyiségben.

A műtöböl a pihenőhelyiségbe szállítják, ahol 1 óra múlva ihat, 2 óra múlva lábra állhat, 4 óra múlva pedig saját lábán elhagyhatja az intézetet. A műtét napján nem vezethet, ebből kifolyólag csak kísérettel engedhetjük haza.



Műtét utáni kezelés, gyógyszerek, életmód otthon, orvosi ellenőrzés

- A műtét során egy felszívódó szivacs tampon kerül felhelyezésre. Ezzel semmi teendője nincs, a műtét másnapján az első székeléssel együtt távozik az a rész, ami nem szívódott fel.
- A műtétet követő időszakban a táplálkozásnál nincs szigorú diétás előírás. Arra kell ügyelni, hogy mind a székrekedést, mind a hasmenést próbálja elkerülni. Ennek érdekében étkezésekhez ajánlott étkezési korpát szedni, valamint a megfelelő folyadékpótlásra kifejezetten figyeljen oda.
- Fájdalom esetén az Ön által már korábban is használt fájdalomcsillapítót alkalmazza bátran (cataflam, advil, panadol, algopyrin, stb.)
- Székelés után gyenge vérzés a műtét utáni 1-2 hétben előfordulhat.
- A felírt kúpot napi 2x (este és nappal) kell alkalmazni tisztálkodás után, amíg a műtéti terület fájdalmas- ez általában 1 hét.
- Detralexet emelt dózisban a műtét másnapjától kell szednie. Első 4 napban napi 6 szemet (reggel, délben, este 2x), 5-7. napig napi 4(reggel, este 2x) szemet kell bevenni.
- A műtéti terület beödémásodhat, ami a gyógyulási folyamat természetes része, a teljes gyógyulási idő 8-12 hét is lehet.
- A műtéti területet az ödéma és a lokális gyulladás miatt tisztálkodás után Betadinnal fertőtlenítsen legalább 1 hétig.

Műtét utáni időszakban kímélő életmód javasolt, kerülni kell a fokozott fizikai megterhelést, kifejezetten nehéz súlyok emelését. A beteg el tudja látni magát, mozgásképes marad és szellemi munkát is végezhet.



Az orvos határozza meg az egyéb gyógyszerek szükségességét, a kontroll időpontját. A kezelésekről való távolmaradás és az ebből adódó esetleges egészségromlás a beteg felelősségét terheli! A páciens az orvosi utasításokat betartja, kötelező ellenőrző vizsgálatokon megjelenik a kezelő orvos által meghatározott időpontokban. Általánosságban elmondható- hogy a műtét után 2 héttel, majd fél év múlva azt követően pedig évente kötelező az ellenőrzésen való megjelenés.

A beavatkozás következményei

Közvetlenül a műtét után feszülő fájdalom természetes, ezért a fájdalomcsillapítást azonnal megkezdjük. A műtési terület beödémásodhat, ami a gyógyulási folyamat természetes része. Ezen kívül székelés után gyenge vérzés a műtét utáni 1-2 hétben előfordulhat.

Milyen tünetek észlelésekor kell azonnal a kezelőorvoshoz fordulni

A műtét után fellépő láz, nagyfokú vérzés esetén azonnal fel kell keresni az operáló orvost.

Lista:

1. 2 hétnél nem régebbi labor eredmény
2. 2 hétnél nem régebbi EKG eredmény
3. Egy éven belüli mellkasröntgen vagy tüdőszűrő eredmény
4. Árajánlat
5. Altatás előtti nap délig lehet szilárd táplálékot fogyasztani, éjfél-től enni, inni, dohányozni, rágózni már **NEM SZABAD!**
6. Kényelmes ruhát, papucsot hozhat magával.
7. Rendszeresen szedett gyógyszereket az előzetes megbeszélés alapján kell bevenni!
8. Műtési területek szőrtelenítése (amennyiben szükséges)
9. Szervezési díj elutalása

Köszönjük megtisztelő bizalmát!

Dr. Rozsos István

Sebész és érsebész szakorvos

www.thetakozeptpecc.hu

E-mail: thetakozept@gmail.com

Kapcsolattartó:

Sárosi Judit

+36 20 402 4224